

江苏大学
硕士研究生入学考试样题

科目代码： 308

A卷

科目名称 护理综合

满分：300分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、最佳选择题（每题 1.5 分，共 180 分）

1. 某截瘫患者入院，为了防止患者出现皮肤完整性受损，护士在利用护理程序为其解决这一健康问题时，所需要的理论框架是（ ）
A. 压力和适应理论 B. 系统论 C. 人的基本需要层次论
D. 信息交流论 E. 解决问题论
2. 关于护理程序的概念，正确的是（ ）
A. 它是一种护理工作的分工类型 B. 它是一种工作的简化形式
C. 它是一种系统地解决护理问题的方法 D. 它是一种技术操作的程序
E. 它是一种帮助病人的方法
3. 下列不属于护理诊断的是（ ）
A. 体温过高 B. 营养失调 C. 急性胃肠炎 D. 活动无耐力 E. 有皮肤受损的危险
4. 属于护理程序计划阶段的内容是（ ）
A. 评价患者反应 B. 分析资料 C. 提出护理诊断
D. 确定护理目标 E. 整理病人资料
5. 以下客观资料，记录正确的是（ ）
A. 每天排尿 1-2 次，量少 B. 咳嗽剧烈，有大量黏痰
C. 每天饮水 5 次，每次约 200ml D. 每餐主食 2 碗，一日 3 餐
E. 持续低热 1 个月，午后明显
6. 人们在异国他乡，生活文化与习惯于原有文化差异，导致不愿与当地人接触，这属于哪个阶段（ ）
A. 蜜月阶段 B. 沮丧阶段 C. 恢复调整阶段 D. 适应阶段 E. 耗竭阶段
7. 纽曼提出的护理理论是（ ）
A. 以环境概念为核心的护理理论 B. 自理模式 C. 适应模式
D. 健康系统模式 E. 以上都不对

8. 根据 Orem 自理模式的内容，属于健康不佳时的自理需求是（ ）

- A. 摄入空气、水、食物
- B. 维持独处和社会交往的平衡
- C. 应对失去亲人的情况
- D. 患病后做出相应的生活方式改变
- E. 预防对健康有危害的因素

9. 下列关于护理健康教育程序的表述中，不正确的是（ ）

- A. 护理健康教育程序是一个系统的、连续不断的过程
- B. 护理健康教育程序遵循护理程序的总体要求
- C. 通过实施护理健康教育计划达成教育目标
- D. 由评估、设立目标、制定计划、实施计划、效果评价等环节组成
- E. 评价是指健康教育程序完成后对效果的检测

(10-11题共用题干) 患者李某，46岁，私企老板，经常应酬熬夜，进食油腻食物并大量吸烟、饮酒，近来发现体重迅速增加，体力和精力降低。

10. 对于该患者，最主要的学习需求是（ ）

- A. 如何减轻工作强度
- B. 如何提高体力和精力
- C. 如何减肥的方法
- D. 如何建立正确的生活方式和行为习惯
- E. 肥胖的不良后果

11. 对该患者，适宜的健康教育方法为（ ）

- A. 专题讲座法
- B. 角色扮演法
- C. 个别会谈法
- D. 讨论法
- E. 展示教学法

12. 医疗事故是医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，（ ）造成患者人身损害的事故。

- A. 故意
- B. 无过错
- C. 过错
- D. 过失
- E. 无法避免

13. 急性上呼吸道病人的病室内相对湿度宜维持在（ ）

- A. 30%-35%
- B. 35%-40%
- C. 40%-45%
- D. 45%-50%
- E. 50%-60%

14. 对内源性感染的预防措施哪项不妥（ ）

- A. 合理使用抗生素
- B. 仔细检查病员潜在病灶。
- C. 对易感染人群均采取保护性隔离
- D. 对感染危险指数高的病员，采取保护性隔离。
- E. 根据病情轻重选择恰当的隔离方式。

15. 患者，男64岁，因肺心病导致呼吸困难，让其采取半坐卧位的原因是（ ）

- A. 使患者逐渐适应体位变化，利于向站立过渡
- B. 减轻腹部切口疼痛
- C. 防止感染向上蔓延
- D. 减少局部出血
- E. 减轻心脏负担

16. 若为促进产后子宫复原，患者可采用（ ）

- A. 截石位
- B. 膝胸位
- C. 头低足高位
- D. 头高足低位
- E. 去枕仰卧位

17. 股静脉穿刺部位为（ ）
A. 股动脉内侧 0. 5cm B. 股动脉外侧 0. 5cm C. 股神经内侧 0. 5cm
D. 股神经外侧 0. 5cm E. 股动脉和股神经之间
18. 下列哪项是 NREM 第三时相的生理表现（ ）
A. 呼吸均匀，脉搏减慢 B. 肌肉松弛、心跳缓慢
C. 全身完全松弛，呼吸缓慢均匀 D. 心率、血压，呼吸大幅度波动。
E. 眼肌活跃，眼球迅速转动，易出现梦境
19. 使用化学消毒剂时，不正确的做法是（ ）
A. 用过氧乙酸浸泡金属器械 B. 碘酊不能用于黏膜消毒 C. 洗必泰不能与肥皂合用
D. 消毒用的乙醇浓度勿超过 80% E. 戊二醛可用于浸泡内镜
20. 病情与呼吸异常不符的是（ ）
A. 高热时呼吸浅而快 B. 脑水肿时呼吸深而慢 C. 酸中毒时呼吸深而慢
D. 巴比妥中毒时呼吸浅而快 E. 临终患者呼吸加快与呼吸变慢交替出现
21. 药物中毒后可引起双侧瞳孔散大的是（ ）
A. 洋地黄 B. 颠茄类 C. 氯丙嗪 D. 吗啡 E. 毛果芸香碱
22. 假性尿失禁（充溢性尿失禁）表现为（ ）
A. 当膀胱充盈到一定压力时，即可不自主溢出尿液
B. 当咳嗽时不自主地有少量尿液排出
C. 膀胱内稍有尿液不自主排出
D. 运动时致尿液排出
E. 膀胱与阴道之间有瘘道不自主地有尿液排出
23. 患者，男，89岁，消瘦，卧床。护士巡视发现其骶尾部红、肿、硬结、有小水泡和上皮剥落，触痛，有渗液。判断该患者的情况是（ ）
A. 压疮淤血红润期 B. 压疮浸润溃疡期 C. 压疮炎性前期
D. 压疮炎性浸润期 E. 局部皮肤感染
24. “地西泮 2.5mg, po, sos”此医嘱属于（ ）
A. 长期医嘱 B. 临时医嘱 C. 长期备用医嘱 D. 临时备用医嘱 E. 口头医嘱
25. 肌内注射时，以下选位方法的描述错误的是（ ）
A. 臀大肌：从尾骨向左或向右划一水平线，然后从髂嵴最高点作一垂线，选其外上象限并避开内角
B. 臀大肌：取髂前上棘和尾骨连线的外上三分之一处

C. 臀中、小肌：以示指尖和中指尖分别置于髂前上棘和髂嵴下缘处，在示指和中指构成的角内

D. 臀中、小肌：髂前上棘外侧三横指处(以患者手指为准)

E. 股外侧肌：大腿外侧，髋关节以下、膝关节以上10cm，宽约7.5cm的区域

26. 针对疾病饮食指导，不正确的是（ ）

A. 高热量饮食可用于大手术后患者

B. 高蛋白质饮食可用癌症患者

C. 低蛋白质饮食可用于尿毒症患者

D. 低盐饮食可用于高血压患者

E. 高膳食纤维饮食可用于伤寒患者

27. 空气栓塞病人应避免空气阻塞（ ）

A. 肺动脉入口 B. 主动脉入口 C. 肺静脉入口 D. 下腔静脉入口 E. 上腔静脉入口

28. 洗胃时，一次洗胃液灌入量应不超过（ ）

A. 100ml

B. 200ml

C. 300ml

D. 400ml

E. 500ml

29. 脉压增大主要见于（ ）

A. 心包积液

B. 心肌梗死

C. 心动过速

D. 主动脉硬化

E. 休克

30. 鼻饲插管中患者出现呛咳、发绀。护士正确的处置是（ ）

A. 嘱患者深呼吸，让患者休息片刻后再继续插管 B. 托起患者的头部插管

C. 拔出胃管，让患者休息片刻后重新插管

D. 嘱患者做吞咽动作

E. 用注射器抽吸胃液

31. 患者，男，36岁，静脉输液后沿血管走行出现条索状红线、肿胀、疼痛。若用乙醇湿热敷，宜选用的浓度是（ ）

A. 10%

B. 20%

C. 45%

D. 75%

E. 95%

32. 呼气带有刺激性蒜味常见于（ ）

A. 肝性脑病

B. 氯丙嗪中毒

C. 酮症酸中毒

D. 尿毒症

E. 有机磷农药中毒

33. 患者，女，25岁，因足部被生锈铁钉刺伤就诊。清创处理后，遵医嘱拟给予TAT注射。护士为患者行TAT皮肤过敏试验，配制的皮试液浓度应为（ ）

A. 15U/ml

B. 150U/ml

C. 1500U/ml

D. 20万U/ml

E. 80万U/ml

34. 不属于吸气性呼吸困难的情况是（ ）

A. 气管痉挛

B. 喉头水肿

C. 气管异物

D. 喉癌

E. 支气管哮喘

35. 颅内压增高病人的生命体征变化（ ）

A. 呼吸深慢，脉搏缓慢，体温升高，双侧瞳孔散大

B. 呼吸浅快，脉率增快，体温上升，双侧瞳孔不等大

- C 呼吸减慢，脉搏加快，体温正常，双侧瞳孔缩小
D 呼吸减慢，脉搏减慢，体温上升，双侧瞳孔缩小
E. 呼吸浅快，脉搏骤起骤落，体温上升，双侧瞳孔缩小
36. 下列漱口溶液中，可用于口腔真菌感染治疗的是（ ）
A. 复方硼酸溶液 B. 1%-5% 过氧化氢溶液 C. 0.1% 醋酸溶液
D. 1%-3% 过氧化氢溶液 E. 1%-4% 碳酸氢钠溶液
37. 肺炎链球菌肺炎最具有特征性的表现是（ ）
A. 发热、寒战 B. 呼吸困难 C. 咳铁锈色痰 D. 咳嗽、胸痛 E. 发绀
38. 支原体肺炎治疗首选（ ）
A. 红霉素 B. 青霉素 C. 氯霉素 D. 万古霉素 E. 氨基糖苷类
39. 下肢深静脉血栓形成的最危险的并发症是（ ）
A. 下肢溃疡 B. 下肢水肿 C. 下肢坏死 D. 肺栓塞 E. 出血
40. 慢性阻塞性肺气肿最典型的症状是（ ）
A. 突然出现的呼吸困难 B. 夜间阵发性呼吸困难 C. 逐渐加重的呼吸困难
D. 慢性咳嗽、咳痰 E. 喘息
41. 患者，男，65岁，慢性肺心病10年，近几日因感冒而气急，咳嗽，痰不易咳出，口唇发绀，下肢水肿。护士遵医嘱给患者吸氧，易采用（ ）
A. 低浓度间断吸氧 B. 高浓度间断吸氧 C. 低浓度持续吸氧
D. 高浓度持续吸氧 E. 35%—50%浓度持续吸氧
42. 呼吸衰竭最早出现的最常见的症状是（ ）
A. 呼吸困难 B. 发绀 C. 精神症状 D. 心血管系统症状 E. 恶心呕吐
43. 陈女士，34岁，确诊为系统性红斑狼疮，用糖皮质激素治疗的主要机制是（ ）
A. 抗休克，改善循环 B. 抑制过敏反应 C. 控制炎症，抑制免疫反应
D. 降低内毒素反应 E. 抑菌，避免继发感染
44. 慢性阻塞性肺气肿的病理改变不包括（ ）
A. 细支气管管壁充血、水肿和炎性细胞浸润
B. 外观呈灰白或苍白，表面可有大小不等的大疱
C. 肺血供增多
D. 与细支气管伴行的肺小血管有炎性改变
E. 弹力纤维网破坏
45. 控制哮喘急性发作的首选药物是（ ）

- A. 氨茶碱 B. 色甘酸钠 C. 青霉素 D. 沙丁胺醇 E. 地塞米松

46. 下列有关急性肺水肿病人吸氧时酒精湿化的浓度和目的，描述正确的是（ ）

- A. 20%-30%，减轻肺内充血水肿 B. 20%-30%，预防肺部感染
C. 50%-70%，预防肺部感染 D. 20%-30%，降低肺泡内泡沫的表面张力
E. 20%-30%，降低肺泡表面张力

47. 当护士发现病人室颤时，首选的抢救措施是（ ）

- A. 吸氧 B. 开放静脉 C. 电除颤 D. 气管插管 E. 心脏按压

48. 心绞痛与急性心肌梗死的区别之一是（ ）

- A. 前者胸痛程度更重 B. 前者含硝酸甘油有效 C. 前者更持久
D. 前者无诱因 E. 前者有大汗淋漓

49. 患者，男，有高血压病史，突然出现剧烈头痛、烦躁并伴有恶心、呕吐、意识模糊等症状，护士应考虑患者情况是（ ）

- A. 高血压性心脏病 B. 高血压脑病 C. 出血性脑卒中
D. 恶性高血压 E. 高血压危象

50. 心源性水肿最早出现的部位是（ ）

- A. 眼睑 B. 上肢 C. 下肢 D. 踝部 E. 会阴

(51-52题共用题干)

病人，男，67岁。高血压病史20余年。活动后心慌、气促1余年。近2个月来上述症状加重，吃饭、平地走路即感心慌，休息半小时到1小时方可缓解，偶有咳嗽、咳少量白黏痰。

51. 病人目前的心功能可能为（ ）

- A. I 级 B. II 级 C. III 级 D. IV 级 E. V 级

52. 不适当的护理措施是（ ）

- A. 绝对卧床休息 B. 与病人一起制定活动计划 C. 加强心理疏导
D. 输液速度为20-30滴/分 E. 遵医嘱吸氧

53. 导致右心功能不全发生的病理生理学基础是（ ）

- A. 肺循环淤血 B. 体循环淤血 C. 心肌缺血
D. 心室重构增厚 E. 冠状动脉痉挛

54. 患者，男，65岁。近1年来血压逐渐升高，伴头痛、烦躁、心悸、多汗等，上周出现视物模糊。查体：血压220/130mmHg，心率180次/分，心浊音界向左下扩大。考虑该患者为（ ）

- A. 高血压 2 级 B. 高血压 1 级 C. 高血压脑病 D. 恶性高血压 E. 高血压危象
55. 病人男，21岁。既往体健，体检时肝功能正常，抗-HBs 阳性，HBV 其他血清病毒标记物均为阴性。其很担心自己患上乙型肝炎，护士应告知病人其此时的状况是（ ）
A. 乙型肝炎且有传染性 B. 乙型肝炎但病情稳定
C. 乙型肝炎病毒携带状态 D. 处于乙型肝炎恢复期
E. 对乙型肝炎病毒具有免疫力
56. 某人患十二指肠溃疡，除有空腹痛进食后缓解外，突然发生呕吐，呕吐物为昨天吃的食物，引发原因是（ ）
A. 食管炎 B. 急性胃炎 C. 胆石症 D. 幽门梗阻 E. 溃疡急性发作
57. 诊断慢性胃炎最可靠的方法是（ ）
A. 病史和临床表现 B. 行胃镜检查 C. 胃液分析
D. 胃肠钡餐检查 E. 细菌检查
58. 病人男，43岁，踢球时突感左臂及心前区剧痛，有濒死感，就地休息30分钟为缓解，伴烦躁不安、恶心、出冷汗，急送至急诊科。心电监护示多导联ST段弓背状抬高，T波倒置，可见异常深而宽Q波，最可能发生了（ ）
A. 稳定型心绞痛 B. 急性心包炎 C. 急性心肌梗死
D. 心脏神经官能症 E. 急性主动脉夹层动脉瘤
59. 我国急性胰腺炎最常见的病因是（ ）
A. 胆管结石 B. 暴饮暴食 C. 胆道疾病 D. 感染 E. 饮酒中毒
60. 消化道出血时每日出血量至少超过（ ）毫升才会出现黑便。
A. 20 B. 30 C. 40 D. 50 E. 80
61. 病人，女，44岁。患心肌梗死住院治疗。首次静脉泵入硝酸甘油时，在30分钟内应注意特别注意是（ ）
A. 尿量 B. 中心静脉压 C. 血氧饱和度 D. 呼吸 E. 血压和心率
62. 患者，男，40岁。近几天来上腹部疼痛不适反复发作，2小时前在睡眠中突感上腹刀割样剧痛，继之波及全腹，既往有十二指肠溃疡史。根据临床表现和辅助检查结果，拟诊断为十二指肠穿孔。肠穿孔的重要诊断依据是（ ）
A. 既往病史 B. 腹膜炎和腹腔积液体征 C. B超示腹腔液性暗区
D. X线示膈下游离气体 E. 患者自觉症状
63. 在我国，肝硬化最常见的病因是（ ）
A. 血吸虫 B. 酒精中毒 C. 饮水污染 D. 病毒性肝炎 E. 黄曲霉素

64. 肝性脑病最早出现的临床表现是（ ）
A. 昏睡呼之不应 B. 锥体束征阳性 C. 视物模糊
D. 角弓反张 E. 性格和行为改变
65. 患者，男，56岁。肝硬化病史7年，此次因腹水入院治疗，某日大量利尿放腹水后出现肝性脑病。该患者肝性脑病最主要的诱因是（ ）
A. 上消化道出血 B. 高蛋白饮食 C. 缺钾性碱中毒 D. 感染 E. 药物
66. 急性肾炎水肿多由何处开始（ ）
A. 眼睑 B. 面部 C. 腰部 D. 胫前区 E. 下肢
67. 胰腺癌最常见的首发症状是（ ）
A. 上腹痛及上腹饱胀不适 B. 黄疸 C. 食欲缺乏 D. 消化不良 E. 乏力消瘦
68. 某病人接受冠状动脉造影术后回到病房，医嘱沙袋压迫股动脉穿刺点6h。为防止局部出血和栓塞护士应重点观察（ ）
A. 呼吸 B. 心率 C. 血压 D. 足背动脉搏动 E. 肌力
69. 肾盂肾炎的主要感染途径是（ ）
A. 血性感染 B. 淋巴道感染 C. 上行感染 D. 直接感染 E. 下行感染
70. 病人，男，42岁，诊断为高血压危症，医嘱呋塞米20mg，iv。执行后病人出现乏力，腹胀、肠鸣音减弱症状。该病人可能发生了（ ）
A. 高钾血症 B. 低钾血症 C. 高钠血症 D. 低钠血症 E. 高氯血症
71. 肾性肾小球肾炎首选的降压药是（ ）
A. 血管紧张素转化酶抑制剂 B. 钙通道阻滞剂 C. 血管扩张剂
D. β 受体阻滞剂 E. 利尿剂
72. 男性，50岁，急性肾衰少尿期，病人突然呼吸困难、头痛、头晕、软瘫、心律不齐、心动过缓、腹胀，应考虑（ ）
A. 高血钾症 B. 低血钾症 C. 水中毒 D. 酸中毒 E. 高钙血症
73. 急性肾小球肾炎最主要的临床表现是（ ）
A. 蛋白尿、氮质血症、高血压 B. 水肿、少尿、血尿、高血压
C. 水肿、少尿、蛋白尿、血尿 D. 水肿、少尿、高血压、蛋白尿
E. 水肿、蛋白尿、血尿、高血压
74. 急性白血病患者易发感染，最主要的原因是（ ）
A. 长期贫血 B. 广泛出血 C. 成熟粒细胞减少
D. 白血病细胞广泛浸润 E. 感染

75. 再生障碍性贫血的主要发病机理是（ ）
A. 骨髓造血功能低下 B. 无效红细胞生成 C. 造血原料缺乏
D. 脾功能亢进 E. 红细胞增多
76. 碘化物治疗甲状腺危象的主要作用机制是（ ）
A. 使有机碘形成减少 B. 使增生的甲状腺缩小 C. 抑制已合成的甲状腺释放入血
D. 促进甲状腺激素的合成与释放 E. 减少甲状腺激素的生成
77. 1型和2型糖尿病的共同病因是（ ）
A. 自身免疫 B. 遗传因素 C. 化学因素 D. 生物因素 E. 物理因素
78. 类风湿因子(RF)的主要类型是（ ）
A. IgA型 B. IgD型 C. IgE型 D. IgM型 E. IgG型
79. 患者，男，25岁。因发热、乏力、腕关节、掌指关节肿痛，不能触压，考虑为类风湿性关节炎。X线检查结果为关节周围组织肿胀，滑膜炎，骨质疏松，其机制为免疫复合物形成后（ ）
A. 引起滑膜炎，使骨质疏松 B. 引起滑膜炎，使软骨、骨质疏松
C. 引起关节周围组织破坏 D. 直接刺激骨质破坏
E. 关节囊内液减少，使骨质破坏
80. 高钾血症引起心律失常，静脉注射应首选的药物是（ ）
A. 10%硫酸镁溶液 B. 5%碳酸氢钠溶液 C. 5%氯化钙溶液+等量5%葡萄糖溶液
D. 利尿剂 E. 5%葡萄糖溶液+胰岛素
81. 噻嗪类药物治疗心力衰竭最常见的副作用是（ ）
A. 心率过快 B. 低钾血症 C. 低血糖 D. 心律失常 E. 高钠血症
82. 蛛网膜下腔出血最具诊断价值和特征性的检查是（ ）
A. 腰椎穿刺脑脊液检查 B. 头颅CT检查 C. MR检查 D. 脑血管造影 E. DSA
83. 帕金森病的主要临床特征是（ ）
A. 头痛 B. 头晕 C. 肢体远端感觉异常 D. 静止性震颤 E. 肌强直
84. 患者持续处于睡眠状态，较重的痛觉刺激方能唤醒，能简单、模糊、不完整地答话，自语语言少，停止刺激后立即入睡。该患者的意识障碍程度为（ ）
A.嗜睡 B. 浅昏迷 C. 昏睡 D. 深昏迷 E. 意识模糊
85. 碱中毒时易发生手足抽搐是因为（ ）
A. 低钾 B. 高钠 C. 低氯 D. 低钙 E. 高镁
86. 下列症状中，哪项不是低钾血症的表现（ ）

- A. 肌肉软弱、乏力 B. 腹胀、呕吐、肠鸣音减弱或消失
- C. 血钾在 3.5mmol/L 以下 D. 严重时神志淡漠或嗜睡，往往勉强叫醒后随即入睡
- E. 心电图 T 波高耸而基底较窄，QRS 波群异常增宽
87. 休克时血压及中心静脉压均低，最有效的措施是（ ）
- A. 大量补液 B. 应用血管收缩药 C. 纠正酸中毒
- D. 给予强心剂 E. 应用血管扩张药
88. 在损伤性休克早期不宜进行下列哪项处理（ ）
- A. 大量抗生素 B. 碱性药物 C. 强心剂
- D. 激素 E. 扩血管剂
89. 关于休克病人病情监测，下列哪项认识是错误的（ ）
- A. 精神由兴奋转入抑制，提示病情变化 B. 皮肤黏膜由苍白转为青紫示病情严重
- C. 脉压差越小表示微血管收缩越重 D. 严重呼吸困难提示肺水肿或心衰可能
- E. 如尿量<25ml/h，比重高，表示血容量已纠正
90. 下列哪项不是休克的微循环扩张期的变化（ ）
- A. 乳酸、组胺等使毛细血管前括约肌扩张 B. 血液淤滞于毛细血管床中
- C. 血浆向毛细血管外渗出 D. 血液浓缩、血流缓慢
- E. 产生广泛的微血栓
91. 失血性休克大量输血后应补充（ ）
- A. 10%氯化钾 B. 5%碳酸氢钠 C. 氢化可的松
- D. 10%葡萄糖酸钙 E. 5%氯化钠
92. 全麻过程中，二氧化碳积蓄的早期表现为（ ）
- A. 呼吸深快，肌张力高 B. 血压下降，脉搏变慢
- C. 血压增高，脉搏变慢 D. 呼吸浅慢，肌张力低
- E. 面色苍白，多汗
93. 脓血症与败血症、毒血症最主要鉴别点是（ ）
- A. 血细菌培养阳性 B. 寒战、高热 C. 肝、脾肿大
- D. 白细胞升高及核左移，贫血 E. 出现转移性脓肿
94. 无浸润膀胱原位癌的病变（ ）
- A. 限于膀胱黏膜层 B. 限于固有层 C. 达膀胱浅肌层
- D. 达膀胱深肌层 E. 侵犯膀胱壁外

95. 骨折与脱位均具有的特殊体征是（ ）
A. 异常活动 B. 畸形 C. 弹性固定 D. 关节部位空虚感 E. 骨擦音
96. 下肢急性丹毒首选抗生素为（ ）
A. 四环素 B. 红霉素 C. 庆大霉素 D. 青霉素 E. 氨苄青霉素
97. 气性坏疽预防关键是（ ）
A. 尽快彻底清创 B. 注射多价气性坏疽抗毒素 C. 全身使用大剂量的抗生素
D. 增强机体抵抗力 E. 应用类毒素
98. 烧伤休克期调整补液速度最有效的指标是（ ）
A. 血压 B. 脉搏 C. 末梢循环情况 D. 尿量 E. 精神状态
99. 下列哪项与电接触伤无关（ ）
A. 有“入口”和“出口” B. 体表组织损伤轻，深部组织损伤重
C. 易并发严重感染或大出血 D. 致残率高
E. 易发生多脏器功能损害
100. 给铜绿假单胞菌感染伤口换药时，下列哪项不妥（ ）
A. 应穿隔离衣 B. 换药用品应专用 C. 污染敷料及时倒掉
D. 用过的器械加倍时间浸泡消毒 E. 换药后用肥皂刷手两遍
101. 发病率高的甲状腺癌为（ ）
A. 乳头状腺癌 B. 髓样癌 C. 滤泡状癌 D. 未分化癌 E. 腺瘤癌变
102. 乳癌病发展过程中，最容易受累的是（ ）
A. 胸骨旁淋巴结 B. 腋窝淋巴结 C. 锁骨下淋巴结 D. 肺 E. 肝
103. 骑跨伤造成尿道损伤的部位是（ ）
A. 尿道悬垂部 B. 尿道球部 C. 尿道膜部 D. 前列腺部尿道 E. 膀胱颈部
104. 乳房的正确检查方法应是（ ）
A. 内上、外上、内下、中央各区 B. 外上、外下、内上、内下、中央各区
C. 中央、内下、内上、外上、外下 D. 外上、内上、外下、内下、中央各区
E. 内下、内上、外下、外上、中央各区
105. 急性乳房炎的早期表现中，下列哪项是错误的（ ）
A. 局部胀痛 B. 体温升高 C. 表面红热 D. 明显压痛 E. 搏动性疼痛
106. 乳房后脓肿正确的切口应为（ ）
A. 乳房下皱襞处做弧形切口 B. 乳晕边缘做弧形切口
C. 压痛明显处做放射状切口 D. 绕过乳头的直径口

- E. 通过乳晕的放射状切口
107. 嵌顿性腹股沟斜疝经手法复位成功后，护理时要特别注意（ ）
A. 神志改变 B. 有无腹胀 C. 有无腹痛、腹肌紧张
D. 有无排便、排气 E. 体温、脉搏变化
108. 胫骨上端骨折之处，足不能背伸、外翻。小腿外侧感觉消失，提示有（ ）
A. 腓总神经损伤 B. 胫神经损伤 C. 股神经损伤
D. 坐骨神经损伤 E. 闭孔神经损伤
109. 腹膜炎的治疗最重要的是（ ）
A. 禁食、胃肠减压 B. 抗生素的联合应用 C. 清理腹腔、吸尽腹腔脓液
D. 有效的腹腔引流 E. 腹膜炎的病灶处理
110. 男性，45岁，突然感到畏寒发热、厌食、乏力，伴有尿频、尿急、尿痛，排尿困难，骶部和耻骨上区不适，右侧睾丸疼痛。肛诊前列腺大，有压痛。尿三杯试验的第一杯尿变化明显，镜检有白细胞；第二杯尿清变化不明显；第三杯明显变化，尿浊，镜检大量白细胞。首先应考虑（ ）
A. 急性肾盂肾炎 B. 急性膀胱炎 C. 急性前列腺炎
D. 急性附睾炎 E. 尿路结石并发感染
111. 迷走神经切断术后并发症不包括下列哪项（ ）
A. 胃潴留 B. 溃疡复发 C. 吞咽困难 D. 胃小弯坏死穿孔 E. 胆汁反流性胃炎
112. 说明有肠梗阻的重要腹部体征是（ ）
A. 腹部压痛 B. 腹式呼吸减弱 C. 腹部膨隆，并有肠型及蠕动波
D. 腹肌紧张和反跳痛 E. 移动性浊音
113. 小儿肠套叠，可采用空气灌肠复位，但其时间限制在起病后不超过（ ）
A. 8h B. 12h C. 24h D. 36h E. 48h
114. 下列哪种疾病与结肠癌关系密切（ ）
A. 回盲部结核 B. 家族性结肠息肉病 C. 溃疡性结肠炎
D. 血吸虫结肠炎 E. 克隆病
115. 内痔的早期症状为（ ）
A. 痔核脱出 B. 大便出血 C. 大便疼痛
D. 里急后重 E. 肛门周围瘙痒
116. 门静脉高压症并发上消化道大出血时，首先应采用的有效止血方法是（ ）
A. 断流术 B. 三腔二囊压迫法 C. 脾切除术

D. 输新鲜血 E. 胃底静脉缝扎术

117. 与原发性肝癌的发生关系最密切的是()

- A. 胆道感染 B. 肝炎后肝硬化 C. 血吸虫性肝硬化
D. 酒精中毒性肝硬化 E. 肝脏良性肿瘤

118. 急腹症诊断不明确时,下列哪一项处理是错误的()

- A. 严密观察,及时反复检查 B. 禁用泻药及灌肠
C. 可以适当地应用吗啡药物止痛 D. 在观察过程中防治休克
E. 应用抗生素控制感染

119. 胸壁反常呼吸运动是哪一种胸部损伤时的主要改变()

- A. 血胸 B. 开放性气胸 C. 多根多处肋骨骨折
D. 两侧多根肋骨骨折 E. 胸部爆震伤

120. 关于闭式胸膜腔引流术,下列哪项是正确的()

- A. 病人取平卧位 B. 需根据体征和X线检查明确部位
C. 一般在腋中线和腋前线之间的4~6肋间 D. 引流气体常选锁骨中线第3肋间
E. 引流管插入胸腔内5~6cm,外接无菌水封瓶

二、多项选择题(每题2分,共60分)

1. 我国现行的护理法规的种类包括()

- A. 由国家主管部门通过立法机构制定的法律、法令
B. 根据卫生法,有政府或地方主管当局制定的规章制度
C. 政府授权专业团体制定的会员资格认可标准
D. 政府授权专业团体制定的护理实践的规定
E. 政府授权专业团体制定的护理实践的章程、条例等

2. 护理概念的发展及演变过程包括以下几个阶段()

- A. 疾病为中心 B. 病人为中心 C. 护患关系为中心
D. 护理伦理为中心 E. 健康为中心

3. 医院感染的易感人群是()

- A. 机体免疫功能严重受损者 B. 婴幼儿及老年人 C. 营养不良者
D. 接受各种免疫制剂治疗者 E. 大面积烧伤患者

4. 双侧瞳孔放大常见于()

- A. 颅内压增高 B. 颅脑损伤 C. 濒死状态 D. 脑疝 E. 洋地黄中毒

5. 以下疾病需要限制蛋白质摄入的是()

- A. 糖尿病 B. 尿毒症 C. 肾病综合征 D. 肝昏迷 E. 甲亢
6. 使血压值偏低的因素有 ()
A. 袖带缠裹过紧 B. 袖带太宽 C. 水银量不足 D. 连续多次测量 E. 袖带过窄
7. 输液应该注意的原则是 ()
A. 先盐后糖 B. 先晶后胶 C. 先快后慢
D. 液种交替 E. 尿畅补钾
8. 洗胃的禁忌证为 ()
A. 食道阻塞 B. 食管胃底静脉曲张 C. 昏迷 D. 胃癌 E. 厌食症
9. 侧卧位时，易发生压疮部位的是 ()
A. 耳廓 B. 肩峰 C. 髋部 D. 膝关节内外侧 E. 骶尾部
10. 风湿性疾病的临床特点是 ()
A. 以血管或结缔组织慢性炎症的病理改变为基础
B. 呈发作与缓解相交替的慢性病程
C. 同一疾病临床表现相似
D. 免疫学异常或生化改变
E. 治疗效果有较大的个体差异
11. 哪些疾病可出现血压降低 ()
A. 急性心肌梗死 B. 心力衰竭 C. 肾上腺皮质功能减退
D. 肾上腺髓质肿瘤 E. 极度衰竭
12. “三凹征”是指吸气时机体 () 部位明显凹陷
A. 胸骨上窝 B. 心前区 C. 锁骨上窝 D. 肋间隙 E. 腹上角
13. 急性型再生障碍性贫血的临床特点是 ()
A. 早期主要表现出血和感染 B. 出血广泛而严重
C. 肝、脾、淋巴结肿大 D. 全血细胞减少
E. 贫血为主要表现，出血和感染不明显
14. 引起慢性心力衰竭常见的诱因包括 ()
A. 急性呼吸道感染 B. 心律失常 C. 压力过大 D. 妊娠 E. 暴饮暴食
15. 患者，男，75岁，吸烟史20年，肥胖，且高血压达160/95mmHg。下列健康教育内容中错误的是 ()
A. 保存情绪稳定 B. 大量运动 C. 高热量，高糖饮食
D. 戒烟，可饮酒 E. 定期检测血压

16. 消化性溃疡常见的并发症有（ ）
A. 大量出血 B. 急性穿孔 C. 幽门梗阻 D. 癌变 E. 感染
17. 漏出液的特点为（ ）
A. 比重 1.018 以下 B. 外观透明或微混，色淡黄 C. 可找到病原菌
D. 黏蛋白试验阴性 E. 蛋白定量 25g / L 以下
18. 结核毒血症症状严重的渗出型结核性腹膜炎，短期使用糖皮质激素的作用有（ ）
A. 抑制结核菌繁殖 B. 减轻炎症渗出 C. 加速腹水吸收
D. 减少肠粘连 E. 减少纤维化
19. 有关痛风临床表现的叙述，正确的有（ ）
A. 急性关节炎是痛风的首发症状，最易累及第一跖趾关节
B. 痛风石是痛风的特征性损害，是尿酸盐沉积所致
C. 可出现蛋白尿、血尿、氮质血症等痛风性肾病表现
D. 可因尿酸高致尿路结石
E. 代谢综合征常与痛风伴发
20. 关于弥散性血管内凝血病人的病情变化，正确的描述是（ ）
A. 突然胸痛、呼吸困难、咯血提示肺栓塞
B. 头痛、抽搐、昏迷等提示脑栓塞
C. 腰痛、血尿、少尿或无尿，甚至发生急性肾衰提示肾栓塞
D. 有消化道出血提示胃肠黏膜栓塞
E. 皮肤干性坏死，手指、足趾、鼻、颈、耳部发绀提示皮肤栓塞
21. 影响伤口愈合的全身性因素有（ ）
A. 营养不良 B. 伤口感染 C. 慢性消耗性疾病 D. 药物 E. 供氧不足
22. 麻醉前常规应用抗胆碱药的主要目的（ ）
A. 防止恶心、呕吐 B. 减少呼吸道分泌物 C. 防止呼吸抑制
D. 减弱迷走神经反射 E. 防止过敏
23. 化脓性感染病人的护理诊断包括（ ）
A. 体温过高 B. 组织灌注量改变 C. 有关疾病知识缺乏
D. 有并发症的危险 E. 生活处理能力低下
24. 麻醉期间发生低血压的常见原因是（ ）
A. 麻醉过深 B. 血容量不足 C. 迷走神经反应
D. 手术刺激 E. 术中没常规给升压药

25. 肝脓肿病人的临床表现是（ ）
A. 发热 B. 肝区疼痛 C. 肝脏肿大 D. 脾脏肿大 E. 白细胞升高
26. 为预防术后肺部并发症，可采用哪些措施（ ）
A. 急性呼吸道炎症治愈即可手术 B. 术前练习深呼吸动作
C. 术前 1~2 周禁烟 D. 咳嗽及时用镇咳剂
E. 痰液较多者可予以吸痰
27. 胃、十二指肠溃疡穿孔病人术前准备与护理包括（ ）
A. 禁食、禁饮 B. 保持有效的胃肠减压
C. 按时使用抗生素、控制感染 D. 严密观察生命体征
E. 剧烈腹痛时可用止痛药
28. 颅后窝骨折可并发哪些神经的损伤（ ）
A. 面神经 B. 舌咽神经 C. 迷走神经 D. 副神经 E. 舌下神经
29. 肺切除术后的并发症是（ ）
A. 出血 B. 张力性气胸 C. 支气管胸膜瘘 D. 急性肺水肿 E. 心力衰竭
30. 缺血性肌挛缩常并发于（ ）
A. 肱骨髁上骨折 B. 尺桡骨上 1/3 段骨折 C. 胫腓骨上 1/3 段骨折
D. 股骨干骨折 E. 前臂神经损伤

三、案例分析题（每题 20 分，共 60 分）

（一）患者方某，42 岁，半年前丈夫因病去世。患者主诉入睡困难，难以维持睡眠，睡眠质量差 3 个月。近 1 个月来出现了头晕目眩、心悸气短、体倦乏力、急躁易怒、注意力不集中、健忘等症状，工作效率明显下降。请问：

1. 该患者目前主要的健康问题是什么？（3 分）
2. 引起该健康问题的主要原因是什么？（3 分）
3. 如果，你是责任护士小李，你将如何运用沟通的技巧与她进行交谈？（7 分）
4. 应如何采取措施解决该患者的健康问题？（7 分）

（二）李女士，56 岁，黏液血便 3 个月，每日排便 3~5 次，伴肛门坠胀，偶感下腹胀痛，排气或排便后可缓解，体重减轻约 3kg。体检：外观消瘦、贫血，腹稍胀，无明显压痛、反跳痛，未扪及包块；肛门指检：肛门口较松弛，距肛缘 3cm 处触及高低不平硬块，肠腔狭窄，指套染血迹。请问：

1. 你认为该病人出现什么问题了？依据是什么？（4 分）
2. 尚需哪些检查以协助诊断？（3 分）

3. 若需手术治疗，何种手术方式最适宜？。（3分）

4. 如何对病人进行饮食护理？（4分）

5. 如何对病人进行出院指导？（6分）

（三）张某，男，52岁，厨师，烟龄30年。12年前冬季首次出现咳嗽、咳痰，近三年四季咳嗽、咳痰不断，呈进行性呼吸困难，冬春季加剧。近3天因急性上呼吸道感染，咳脓痰，收入院。身体评估：体温37.9℃，神志恍惚，昼睡夜醒；气促，不能平卧，痰液粘稠，不易咳出；胸廓呈桶状，呼吸音弱，叩诊过清音；听诊双肺底可闻及散在干、湿啰音，动脉血气分析结果： PaO_2 56mmHg, PaCO_2 76mmHg, pH 7.30, HCO_3^- 34mmol/L。

请问：

1. 该病人可能的医疗诊断是什么？需要完善哪些检查？（4分）

2. 一旦确诊，应给予的治疗措施有哪些？（5分）

3. 病人目前的护理诊断问题有哪些？依据是什么？（6分）

4. 经过积极治疗后，病人神志恢复正常，病情好转，护士应给予哪些指导以促进病人康复？（5分）