

上海麻疹腮腺炎风疹联合减毒活疫苗接种知情同意书

麻疹、流行性腮腺炎（简称腮腺炎）、风疹都是由病毒引起的急性传染病。病毒主要由空气飞沫经呼吸道传播，可引发一系列疾病及并发症，无免疫力的人群普遍易感。

麻疹：传染性强，典型临床特征为：发热、皮疹、呼吸道卡它等症状。治疗不及时常常并发喉炎、中耳炎、肺炎、支气管炎和心肌炎等疾病，病死率高。

风疹：临床表现为短暂皮疹、低热、耳后及枕后淋巴结肿大及关节痛等。孕妇感染的最大危害是先天性风疹综合征，引起流产、死产、胎儿先天畸形等。因临床症状体征与麻疹相似，容易在诊疗过程中与麻疹混淆，造成误诊。

腮腺炎：病毒除了侵犯腮腺外，还能感染全身其他腺体，引起脑膜炎、脑膜脑炎、睾丸炎、胰腺炎、卵巢炎等，严重者影响生育

三种疾病在影响身体健康的同时，还带来较重的经济负担。预防上述三种疾病最有效的措施是接种麻疹腮腺炎风疹联合减毒活疫苗，使机体产生相应的抗体，从而得到有效的保护，免受感染！

为安全有效地接种麻腮风疫苗，在接种前将与接种有关信息告知于您，您可以根据自己的具体情况决定是否接种麻腮风疫苗。

【作用】接种本疫苗后，可刺激机体产生抗麻疹病毒、腮腺炎病毒和风疹病毒的免疫力。用于预防麻疹、流行性腮腺炎和风疹。

【接种对象】8月龄以上的麻疹、风疹和腮腺炎易感者。

【接种方式】皮下注射

【不良反应】注射后一般无不良反应，个别人在接种疫苗后24小时内，在注射部位可出现疼痛或触痛，多数情况下于2~3天内自行消失。个别人可能出现一过性发热以及散在皮疹或轻度关节反应，一般不需特殊处理，必要时可对症治疗。

- 【接种禁忌】**
- (1) 已知对该疫苗所含任何成分，包括辅料以及庆大霉素过敏者。
 - (2) 患急性疾病、严重慢性疾病、慢性疾病的急性发作期和发热者。
 - (3) 妊娠期妇女。如对育龄妇女进行接种，接种后3个月内应避免妊娠。
 - (4) 免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗者。
 - (5) 患脑病、未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病者。

为保证您能够安全有效的接种，请您配合医务人员提供以下信息：

是否患有严重疾病？如果有请注明：_____	○是	○否
当前是否发热？	○是	○否
是否有过敏史？如有，请注明对何种物质过敏_____	○是	○否
是否在妊娠期或哺乳期？	○是	○否
是否使用免疫抑制剂、激素或免疫球蛋白等药物？	○是	○否

【注意事项】

- (1) 以下情况者慎用：家族和个人有惊厥史者、患慢性疾病者、有癫痫病史者、过敏体质者、哺乳期妇女。
- (2) 注射免疫球蛋白者应至少间隔3个月以上接种本疫苗，以免影响免疫效果。
- (3) 如出现轻微反应，一般不需要特殊处理，可电话咨询接种单位，必要时可赴医院诊治。

如有其它疑问，请参考说明书。

根据您提供的信息和目前的健康状况，医务人员建议您是否可以接种麻腮风联合减毒活疫苗：

○可以接种 ○不可以接种

以上告知内容本人已经详细阅读，同意医生建议。

您与受种者的关系：○本人 ○其他 (请注明) _____
受种者（或监护人）签字：_____ 联系电话：_____

医生签字：_____ 接种单位：_____

接种日期： 年 月 日